

予防接種

vol.4年報/2009.09.01発行



2 予防接種

? なんで予防接種が必要なの?

私たちの周りには、色々な細菌やウイルスが存在します。私たちはそれに対する免疫をもっている時は病気にはかかりにくいのですが、抵抗力が落ちたり、なくなると病気にかかりやすくなります。赤ちゃんの多くは、お母さんのお腹の中にいるときにお母さんが持っている免疫をもらいます。この抵抗力は生後5ヵ月ごろから徐々に失っていきますので、それ以降は赤ちゃん自身で免疫をつくる必要が出てきます。予防接種は赤ちゃんが抵抗力を高めるためのお手伝いをするものです。細菌やウイルスの力を弱めた生ワクチンを接種し体内で増殖、免疫を獲得したり、不活化した病原菌を



Hibワクチンが始まりました。
日本脳炎が再開になりました。

注射等で複数回接種し、体内に植え付けることによって発病を予防したり、症状を軽くしたりします。細菌やウイルスなどに接する機会が多くなる保育園や幼稚園に入る前までには予防接種により免疫力をつけ、感染症にかからないようにしましょう。

接種スケジュール管理がしやすいように
「予防接種一覧表」をお渡ししています。



接種種別	接種時期	接種回数	接種場所	接種料	接種方法	接種後
BCG	生後2~3ヶ月	1回	保健所	無料	皮下注射	接種後1週間、接種部位が腫れることがあります。
ポリオ	生後2ヶ月、4ヶ月、1歳6ヶ月	3回	保健所	無料	経口接種	接種後2週間、接種部位が腫れることがあります。
DPT	生後2ヶ月、4ヶ月、1歳6ヶ月	3回	保健所	無料	皮下注射	接種後2週間、接種部位が腫れることがあります。
麻疹・風疹混合	生後1歳6ヶ月	1回	保健所	無料	皮下注射	接種後2週間、接種部位が腫れることがあります。
日本脳炎	生後1歳6ヶ月	1回	保健所	無料	皮下注射	接種後2週間、接種部位が腫れることがあります。
Hib	生後2ヶ月、4ヶ月、1歳6ヶ月	3回	保健所	有料	皮下注射	接種後2週間、接種部位が腫れることがあります。
水痘	生後1歳6ヶ月	1回	保健所	無料	皮下注射	接種後2週間、接種部位が腫れることがあります。
狂犬病	生後1歳6ヶ月	1回	保健所	無料	皮下注射	接種後2週間、接種部位が腫れることがあります。



? 予防接種外来でよくある質問

- ▶▶ 突発性発疹症にかかったあと何日開けたら予防接種できますか?
・・・14日間は開けてください。
- ▶▶ 水痘の子と接触しました。何日開けたら予防接種できますか?
・・・21日間開けてください。(潜伏期間と考えられる期間は接種できません)
- ▶▶ 本日の予防接種後お風呂に入っても良いですか?
・・・お風呂は接種後1時間以上経って全身状態に異常がなければ入って良いです。
- ▶▶ 本日の予防接種後、プールに行っても良いですか?
・・・予防接種を受けた日はプールに限らず、激しい運動は避けましょう。
- ▶▶ 予防接種を受けたところが腫れました受診したほうが良いですか?
・・・直径5cm以下の腫れで熱感がなければ経過を見て良いです。
直径5cm以上腫れ熱感があるようなら受診してください。
- ▶▶ BCG接種後1ヵ月頃からジクジクしてきたのですが?
・・・BCG接種後1-2日経つと発赤が一度消失します。2週間から1ヵ月くらいで、点々と針の痕に応じ赤くなります。さらに腫れたり、ジクジクしたりします。中には膿みをもったようになりますが2ヵ月を過ぎるころには治ってきます。ジクジクするときは清潔なガーゼを当てるだけで良いです。

